


Impacto emocional nas mulleres que reciben un resultado positivo do virus do papiloma humano

Edurne Arenaza Lamo

Programa poblacional de cribado de cáncer de cérvix de País Vasco



ANTECEDENTES. Programa de cribado de cáncer de cérvix en País Vasco



EFFECTOS SECUNDARIOS

VPH-AR
> 35 años




DESCENSO DE ESPECIFICIDAD



IMPACTO EMOCIONAL

¿Qué evidencia existe sobre el impacto emocional como efecto secundario del cribado?



Emotional response to testing positive for human papillomavirus at cervical cancer screening: a mixed method systematic review with meta-analysis

Emily McBride ^a, Ovidiu Tatar ^{b,c,h}, Zeev Rosberger ^{b,c,d}, Lauren Rockcliffe ^e, Laura A. V. Marlow ^f, Rona Moss-Morris ^g, Navdeep Kaur ^b, Kristina Wade ^{c,i} and Jo Waller ^f

HEALTH PSYCHOLOGY REVIEW

2021, VOL. 15, NO. 3, 395–429

<https://doi.org/10.1080/17437199.2020.1762106>

Authors	Country	Total n
Alay et al. (2019)	Turkey	80
Andreassen et al. (2019)	Norway	487 HPV arm; 521 cytology arm
Daley et al. (2010)	USA	154
Ferenidou et al. (2012)	Greece	51
Garces-Palacio et al. (2019)	Colombia	675
Hsu et al. (2018)	Taiwan, China	70
Kitchener et al. (2008)	UK	604 concealed arm; 1904 revealed arm
Kwan et al. (2011)	Hong Kong, China	299

Authors	Country	Total n
Maggino et al. (2007)	Italy	72
Maissi et al. (2004)	UK	1376
Maissi et al. (2005)	UK	1011
McBride et al. (2020)	UK	1127
McCaffery et al. (2004)	UK	428
Nagele et al. (2019)	Austria	209
Ngu et al. (2018)	Hong Kong, China	121
Rodriguez et al. (2019)	Mexico	201
Wang et al. (2010)	Taiwan, China	249
Wang et al. (2011)	China	2605

Authors	Country	n
Barrera-Clavijo et al. (2015)	Colombia	93
Barreto et al. (2016)	Brazil	14
Bertram and Magnussen (2008)	USA	10
Daley et al. (2010)	USA	52
Head et al. (2017)	USA	30
Kosenko et al. (2012)	USA	25
Lin et al. (2011)	Taiwan, China	20
Linde et al. (2019)	Tanzania	15
McCaffery and Irwig (2005)	Australia	19
McCaffery et al. (2006)	UK	74
McCurdy et al. (2011)	USA	18
O'Connor et al. (2014)	Ireland	27
Perrin et al. (2006)	USA	52
Tiro et al. (2019)	USA	46


Authors	Country	n
Waller, McCaffery, et al. (2007)	UK	30
Wyndham-West et al. (2018)	Canada	20

20 estudios
12789 mujeres

Ante un VPH (+) las emociones más frecuentes son:

- Ansiedad a corto plazo
- Angustia por los resultados
- Angustia por las relaciones sexuales
- Sentimientos de disgusto y vergüenza
- Sorpresa y miedo al cáncer

McBride E, Tatar O, Rosberger Z, Rockliffe L, Marlow LAV, Moss-Morris R, Kaur N, Wade K, Waller J. Emotional response to testing positive for human papillomavirus at cervical cancerscreening: a mixed method systematic review with meta-analysis. Health Psychol Rev. 2021 Sep;15(3):395-429. doi: 10.1080/17437199.2020.1762106. Epub 2020 May 24. PMID: 32449477



Estrategias para disminuir el impacto emocional

**RIESGO MUY
BAJO**

**PRÓXIMA INVITACIÓN
3/5 AÑOS**



ALTO RIESGO

COLPOSCOPIA.

**RIESGO
MEDIO/BAJO**

**CONTROL AL AÑO
(GINE O MATRONA)**

**NO
CONCLUYENTE**

**REPETIR
(4 meses)**



Primer proyecto para control del impacto emocional

Impacto de los diferentes canales de información en la reducción de la ansiedad en las participantes del cribado de cervix Impact of the Different Information Channels in Reducing Anxiety in Participants of Cervical Cancer Screening (DICRA)

ClinicalTrials.gov PRS
Protocol Registration and Results System
ClinicalTrials.gov ID: NCT05622760



Impacto de los diferentes canales de información en la reducción de la ansiedad en las participantes del cribado de cervix

Impact of the Different Information Channels in Reducing Anxiety in Participants of Cervical Cancer Screening (DICRA)

TABLA 2. RESULTADOS PRELIMINARES		GROUP 1	GROUP 2	p
PSS14	V2-V1	-4.9 (6.8)	-0.9 (5.6)	<0.001
	V2-V1 ajustada por decatipos 1-4	-2.8 (6.6)	-0.3 (4.5)	0.08
	V2-V1 ajustada por decatipo 5-10	-6.7 (6.5)	-1.6 (6.7)	0.002
STAI ESTADO	V2-V1	-5.6 (10.9)	-0.7 (11.0)	0.01
	V2-V1 ajustada por decatipos 1-4	-5.5 (10.1)	-2.8 (8.8)	0.256
	V2-V1 ajustada por decatipos 5-10	-5.6 (11.7)	1.6 (12.7)	0.015
HPV-QoL	V2-V1	18.0 (18.6)	8.8 (15.3)	0.005
	V2-V1 ajustada por decatipos 1-4	6.8 (10.6)	12.5 (15.9)	0.13
	V2-V1 ajustada por decatipos 5-10	26.6 (19.0)	5.1 (14.0)	<0.001
	V2-V1 Bienestar general (item 1-6)	4.3 (5.6)	1.6 (5.2)	0.008
	V2-V1 Bienestar psicológico (item 1-4)	2.9 (4.1)	1.1 (3.7)	0.016
	V2-V1 Bienestar social (item 5-6)	1.5 (2.9)	0.5 (2.5)	0.06
	V2-V1 Salud (item 9-12)	2.5 (3.5)	1.6 (2.9)	0.115
	V2-V1 Sexualidad (item 13-15)	2.2 (3.8)	0.8 (2.8)	0.029
	V2-V1 Contagiosidad (item 7-8)	1.7 (2.4)	1.3 (2.2)	0.323
	V3-V2	15.7 (14.9)	21.4 (28.4)	0.001

**Impacto significativo del
formato informativo
audiovisual en el nivel de
ansiedad (STAI) y calidad de
vida (HPV-QoL)**

**Impacto principalmente en las
mujeres con un tipo de
personalidad más nervioso**

Segundo proyecto para el control del impacto emocional

Capacitación del personal sanitario en herramientas de comunicación para el control del impacto emocional del programa de cribado de
cérvix

		Población	Media	Desviación estándar	Diferencia medias	p
HPV-QoL	GRUPO 1	64	40.13	8.95	4.48	0.004
	GRUPO 2	71	35.65	8.98		
BAKER	GRUPO 1	64	61.16	1.56	4.59	0.045
	GRUPO 2	71	56.56	1.63		



* Resultados preliminares, se presentan como medias y desviación estándar

Impacto significativo de la formación en comunicación en la calidad de vida (HPV-QoL) y en la satisfacción sobre la consulta telefónica

Puntos clave a la hora de informar

- Normalización de la infección del VPH.
- Colposcopia
- Es un programa de prevención. Prueba de cribado no es un diagnóstico
- Vivencia como una oportunidad para cuidarse y mejorar la salud
- Normalización del VPH. Periodo latente de la infección. Preservativo
- Otros medios de búsqueda de información
- Despedida con vía abierta a volver a contactarnos

CONCLUSIONES

Toda intervención sanitaria tiene sus efectos secundarios

Es necesario ser conscientes para poder desarrollar estrategias que amortiguen estos efectos secundarios



moitas
grazas!



Programa poblacional de cribado de cáncer de cérvix de Euskadi
cribadocervix@osakidetza.eus

