




Infeccións de transmisión SEXUAL

Son infeccións que as persoas poden adquirir cando teñen contactos sexuais vaxinais, anais ou buco-xenitais.



XUNTA
DE GALICIA


Que son as infeccións de transmisión sexual (ITS)?

Son infeccións que as persoas poden adquirir cando teñen contactos sexuais vaxinais, anais ou buco-xenitais.

Están aumentando por algúns cambios nos estilos de vida e costumes sociais experimentados nos últimos tempos.

Que se nota?

Os síntomas máis frecuentes son:



Nas mulleres. Fluxo anormal na vaxina; chagas, bochas ou verrugas cerca dos órganos sexuais, ano ou boca; dor na pelve; proído arredor da vaxina; inflamación dun ou máis ganglios arredor da chaga; dor na vaxina na relación sexual; sangrado vaxinal excesivo tendo ou non a menstruación; sangrado vaxinal sen ter a menstruación ou tras a relación sexual; ardor ao ouriñar ou defecar.



Nos homes. Secreción pola uretra; chagas, bochas ou verrugas cerca dos órganos sexuais, ano ou boca; inflamación dun ou máis ganglios arredor da chaga; dor nos testículos ou arredor dos órganos sexuais ou inflamación; proído arredor dos órganos sexuais; ardor e dor ao ouriñar ou defecar.

En moitos casos de infeccións de transmisión sexual non aparecen síntomas ou nótanse pouco.



Que consecuencias teñen se non se tratan?

As infeccións de transmisión sexual, se non se tratan, poden producir consecuencias graves tales como: esterilidade, abortos, problemas no embarazo, transmisión ao fillo/a, cancro de colo de útero, cancro de pene, cancro de ano, lesións cardíacas, enfermidades do sistema nervioso, etc.

As infeccións de transmisión sexual facilitan a transmisión do VIH/sida.



Cales son as máis comúns?

Existen moitas diferentes e poden ser producidas por virus, bacterias, fungos e artrópodos.

As máis importantes son: tricomoniasis, sífilis, gonorrea, clamidiasis, VIH/sida, condilomas acuminados, herpes xenital, hepatites víricas.

Tamén son frecuentes e molestos os piollos pato e a sarna.

Como se collen?

A través do sexo vaginal, anal e buco-xenital, sen utilizar preservativo, cunha persoa que teña unha ITS.

É máis doado infectarse se se cambia a miúdo de parella ou se a parella habitual ten relacións sexuais con outras persoas.

Polas características destas infeccións moitas persoas descoñecen que están infectadas e son transmisoras.

Non é cuestión de confianza senón de sexo seguro e de facer revisións médicas.

Como se poden evitar?

Utilizando sempre e correctamente o preservativo no sexo vaginal, anal e oral. O preservativo (masculino e feminino) é a mellor maneira de previr as ITS.

Falar coa parella sobre a vida sexual.

Acudir ao centro de saúde para unha revisión médica:


- Se tivo unha práctica sexual de risco (sexo sen preservativo, rotura do preservativo ...).
- Se nota algún síntoma das ITS.

Que facer?

Se ten dúbidas de que ten unha destas infeccións ou enfermidades debe acudir ao médico/a de cabeceira. O diagnóstico e tratamento non son dolorosos. Canto antes se inicie o tratamento é menor a posibilidade de ter complicacións futuras.

A consulta é absolutamente confidencial.

Se ten un diagnóstico de infección ou enfermidade debe informar a parella ou parellas coas que tivo relacións sexuais, insistindo en que acudan ao médico/a.





Para máis información:
plan.vih.its@sergas.es



www.sergas.es/Saude-publica/VIH-e-outras-ITS
www.facebook.com/sexinvaders
www.instagram.com/sexinvaders/?hi=es
www.itsinvaders.com/hello-world
<https://www.youtube.com/watch?v=NTje-ODdADc>



**XUNTA
DE GALICIA**

CONSELLERÍA
DE SANIDADE