

Indicadores de consumo de antimicrobianos (pediatría) en Atención Primaria por área sanitaria. Datos globais de receita SERGAS. Galicia, ano 2026, primeiro trimestre. Grupo de idade: menores de 15 anos.

INDICADOR	Galicia	A Coruña	Santiago	Ferrol	Lugo	Ourense	Pontevedra	Vigo
Taxa de consumo de antibióticos de uso sistémico (en DHD)	11,41	8,90	12,23	12,13	10,98	14,48	10,41	12,40
Consumo (en envases) de penicilinas sensibles a betalactamasas (J01CE) respecto ao total (%)	4,79	7,60	3,94	3,85	7,42	1,82	3,60	4,42
Consumo (en envases) de amoxicilina respecto ao total (%)	52,72	54,99	52,57	57,16	53,06	45,35	55,04	52,51
Consumo (en envases) de amoxicinila-clavulánico respecto ao total (%)	15,71	12,37	17,72	14,17	15,04	20,91	17,10	14,22
Consumo (en envases) de amoxicilina sen clavulánico respecto ao total de amoxicilina (%)	77,04	81,64	74,80	80,14	77,91	68,44	76,30	78,68
Consumo (en envases) de macrólidos respecto ao total (%)	16,09	13,13	16,21	15,50	14,30	22,63	12,21	17,49
Consumo (en envases) de cefalosporinas de 3ª xeración respecto ao total (%)	2,28	2,56	2,45	1,64	1,99	2,49	2,26	2,17

DHD: Dose Diaria Definida por cada mil habitantes e día.

Indicadores de consumo de antimicrobianos (pediatría) en Atención Primaria por área sanitaria. Datos globais de receita SERGAS. Galicia, ano 2026, primeiro trimestre. Grupo de idade: de 0 a 4 anos.

INDICADOR	Galicia	A Coruña	Santiago	Ferrol	Lugo	Ourense	Pontevedra	Vigo
Taxa de consumo de antibióticos de uso sistémico (en DHD)	16,40	12,90	16,90	16,85	15,46	20,12	14,57	19,27
Consumo (en envases) de penicilinas sensibles a betalactamasas (J01CE) respecto ao total (%)	2,11	3,30	1,84	2,62	3,19	0,66	1,37	1,79
Consumo (en envases) de amoxicilina respecto ao total (%)	60,44	64,69	59,52	65,52	62,13	53,32	62,10	58,67
Consumo (en envases) de amoxicinila-clavulánico respecto ao total (%)	14,83	11,17	16,67	12,07	15,48	18,38	16,20	14,41
Consumo (en envases) de amoxicilina sen clavulánico respecto ao total de amoxicilina (%)	80,30	85,27	78,12	84,44	80,05	74,37	79,31	80,28
Consumo (en envases) de macrólidos respecto ao total (%)	14,95	12,48	14,82	13,98	12,32	19,43	12,16	17,18
Consumo (en envases) de cefalosporinas de 3ª xeración respecto ao total (%)	2,46	3,04	2,20	1,60	1,90	3,21	2,62	2,31

DHD: Dose Diaria Definida por cada mil habitantes e día.

Indicadores de consumo de antimicrobianos (pediatría) en Atención Primaria por área sanitaria. Datos globais de receita SERGAS. Galicia, ano 2026, primeiro trimestre. Grupo de idade: de 5 a 9 anos.

INDICADOR	Galicia	A Coruña	Santiago	Ferrol	Lugo	Ourense	Pontevedra	Vigo
Taxa de consumo de antibióticos de uso sistémico (en DHD)	10,52	7,97	11,34	11,44	10,81	14,42	10,17	10,44
Consumo (en envases) de penicilinas sensibles a betalactamasas (J01CE) respecto ao total (%)	7,03	11,05	5,81	5,20	11,11	2,76	4,69	6,90
Consumo (en envases) de amoxicilina respecto ao total (%)	52,39	52,76	52,35	58,22	51,79	43,96	56,32	53,58
Consumo (en envases) de amoxicinila-clavulánico respecto ao total (%)	15,14	12,90	17,80	13,54	12,71	21,73	16,06	12,30
Consumo (en envases) de amoxicilina sen clavulánico respecto ao total de amoxicilina (%)	77,58	80,35	74,62	81,13	80,29	66,93	77,82	81,33
Consumo (en envases) de macrólidos respecto ao total (%)	14,25	10,43	15,35	13,38	13,04	23,13	9,42	14,55
Consumo (en envases) de cefalosporinas de 3ª xeración respecto ao total (%)	2,36	2,66	2,76	1,57	2,50	2,21	2,20	2,16

DHD: Dose Diaria Definida por cada mil habitantes e día.

Indicadores de consumo de antimicrobianos (pediatría) en Atención Primaria por área sanitaria. Datos globais de receita SERGAS. Galicia, ano 2026, primeiro trimestre. Grupo de idade: de 10 a 14 anos.

INDICADOR	Galicia	A Coruña	Santiago	Ferrol	Lugo	Ourense	Pontevedra	Vigo
Taxa de consumo de antibióticos de uso sistémico (en DHD)	8,97	7,05	9,94	9,79	8,04	11,03	8,00	9,88
Consumo (en envases) de penicilinas sensibles a betalactamasas (J01CE) respecto ao total (%)	7,33	12,22	5,70	4,26	11,43	2,63	6,38	7,10
Consumo (en envases) de amoxicilina respecto ao total (%)	34,55	34,77	35,86	38,03	31,05	30,62	37,47	34,66
Consumo (en envases) de amoxicinila-clavulánico respecto ao total (%)	18,87	14,43	20,14	19,55	18,57	24,91	20,93	16,97
Consumo (en envases) de amoxicilina sen clavulánico respecto ao total de amoxicilina (%)	64,67	70,67	64,03	66,05	62,57	55,15	64,15	67,13
Consumo (en envases) de macrólidos respecto ao total (%)	22,11	19,51	21,20	22,07	22,19	28,67	17,43	23,23
Consumo (en envases) de cefalosporinas de 3ª xeración respecto ao total (%)	1,71	1,22	2,49	1,86	1,24	1,43	1,62	1,85

DHD: Dose Diaria Definida por cada mil habitantes e día.